



MELA-GO-50-2

50% RETARD KARBAMIDOT TARTALMAZÓ
FEHÉRJEKIEGÉSZÍTŐ

ANALITIKAI ÖSSZETÉTEL:	ME	MELA-GO-50-2
Nyersfehérje	%	150,00
NPN fehérje	%	145,00
Nyerszsír	%	5,00
Nyersrost	%	3,00
Nyershamu	%	11,00
Nátrium (Na)	%	0,30
*NE _m	mg/kg	4,40
*NE _g	mg/kg	3,10
*NE _l	mg/kg	4,20

*számított értékek

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Felhasználható kérődző állatok takarmányozásában, a fehérje ellátás javítására. A termék retard formában tartalmazza a karbamidot, mely a bendőben lassan és egyenletesen hidrolizál. A termék etetésének biztonságát javítja a termékben található könnyen hasznosuló szénhidrátforrás (keményítő és cukor).

Etetési javaslat: tejelő tehén: 150-250 g/állat/nap; kérődző állatokkal (szarvasmarha, juh és kecske) etethető javasolt mennyisége: 0,3 g/testtömeg kg.

ÖSSZETÉTEL

- Karbamid /3d1/ (500 000 mg/kg)
- Hidrogénezett növényi zsír
- Hordozók (1.11.7, 11.1.1, 13.2.2)

ELŐNYÖK (KARBAGO-75 és MELA-GO-50-2)

- Egyedülálló fehérje- és energiaforrás a kérődző állatok számára.
- A speciális retardizálási gyártástechnológiának köszönhetően a karbamid a bendőben lassan és egyenletesen oldódik ki és hidrolizál. Ennek köszönhetően a mérgezés veszélye nélkül és nagyobb hatásokkal használható a karbamid fehérjeforrásként.
- A termékek etetésének biztonságát javítja a termékekben lévő könnyen hasznosuló szénhidrátforrás.
- Kiválóan alkalmas arra, hogy a bendőben könnyen lebomló fehérjeforrások (pl. extrahált napraforgódara, repcedara) egy részét költséghatékonyan helyettesítsük.
- Alkalmazásával kedvezően befolyásolható a kérődző állatok bendőbeli fehérjemérlege (MFN-MFE).
- A retardizáló anyagként használt védett zsír a vékonybélben megemészthető anélkül, hogy a bendőműködést, továbbá a nyersrost emésztést negatívan befolyásolná.
- A védett zsír formájában történő energiabevitel kedvezően befolyásolja az állatok termelését, továbbá javítja az ellés után jelentkező NEB (negatív energiaegyensúly) káros hatásait (pl. anyagcsere eredetű megbetegedések, termékenyülési problémák stb.).

MEGJEGYZÉS

A megadott mennyiségeket napi két részletben célszerű adagolni. A kívánt dózis 10-14 napos folyamatos szokatás után alkalmazható. Kerülni kell a túlادagolást! Teljes dózisu etetése előtt ellenőrizni kell, hogy a takarmányadag egyéb NPN-anyagot nem tartalmaz. A készítményeket csak kifejlett bendőműködéssel és egészséges májműködésű állatokkal szabad etetni! Csak kérődző állatok takarmányozásánál használható!

KISZERELÉS

- 25 kg polietilénnel bélelt papírszák (**KARBA-GO-75**) és 25 kg polipropilén zsák (**00098700 termékszám**)
- 1000 kg nettó tömeg Big bag (**MELA-GO-50-2, 00024000 termékszám**)
- 25 kg zsákos kisz. (**Mela-GO-50-2, 00028900 termékszám**)