

531-223



## VITACALF STANDARD BORJÚ INDÍTÓ KIEG. TAKARMÁNY

A **VITACALF STANDARD BORJÚ INDÍTÓ** kiegészítő takarmány a VitaCalf borjú és növendék takarmányozási program első fázisában a borjak egyedi igényét elégíti ki. Ideális összetétele garantálja a bendő gyors fejlődését, a borjú növekedését az optimális testtömeg gyarapodás mellett. A Vitafort új takarmányozási rendszerével elérhetjük, hogy az üszök életkoruknak megfelelő ütemben fejlődjenek és ezáltal az első 6-10 hónapban maximálisan kihasználjuk a genetikai potenciált!

### ALKALMAZÁSI JAVASLAT

- Az első két nap alatt kizárólag kolosztrummal itassuk a borjakat, ezt követően pedig tejpótló borjútápszerrel.
- A 7-80 napos korig a **VITACALF STANDARD BORJÚ INDÍTÓ** kiegészítő takarmányt etessük ad.libitum.
- Fokozatosan emeljük az adag nagyságát, amíg el nem érjük az **1,5-2,0 kg**-os napi fogyasztást. Az **1,3-1,5 kg**-os napi fogyasztás után a tejpótló itatását beszüntethetjük, megfelelő **takarmányfelvételi kontroll** mellett!!!

Az egyedi ketreces takarmányozási fázisa alatt a **szénaetetés nem szükséges** viszont a fokozatosság elve miatt a választás előtt egy héttel elkezdhetjük a szénaetétést.

A bendőpapillák fejlődését nem a fizikai hanem főleg a kémiai ingerek szabályozzák.

A fermentáció során keletkezett illó zsírsavak közül ebben az időszakban legfontosabbak a bendő fejlődése szempontjából a propionsav és a vajsav ami elsősorban az abrak emésztéséből származik. A szálás nehezebben fermentálódik és térfogatánál fogva korlátozhatja a szárazanyag felvételt és ezáltal csökkenhet a borjú indító táp fogyasztás.

### Javasolt választási időpont. (7-8 hét)

**Az állatok előtt folyamatosan legyen friss ivóvíz, amint elérik az egy hetes kort!**

### ELŐNYEI ÉS JELLEMZŐI

- Magas nyersrost tartalma hozzájárul a bendőműködés gyors kialakulásához.
- XTRACT – tartalma serkenti a bendő papillák növekedését és elősegíti a bendő korai kifejlődését.

| Beltartalom            | ME    | 531-223<br>VITACALF STANDARD BORJÚ<br>INDÍTÓ KIEG. TAKARMÁNY |
|------------------------|-------|--|
| Nedvesség              | %     | 12,22  |
| NE m                   | MJ/kg | 6,12   |
| NE g                   | MJ/kg | 4,05   |
| Nyers. fehérje         | %     | 18,58  |
| MFE                    | %     | 9,68   |
| MFN                    | %     | 11,77  |
| Cukor                  | %     | 4,92   |
| Keményítő              | %     | 24,35  |
| Nyers.rost             | %     | 10,79  |
| Nyers.zsír             | %     | 3,73   |
| Nyers.hamu             | %     | 7,33   |
| Kalcium                | %     | 0,86   |
| Foszfor                | %     | 0,76   |
| Magnézium              | %     | 0,26   |
| Nátrium                | %     | 0,26   |
| Mangán                 | mg/kg | 77,97  |
| Cink                   | mg/kg | 100,76   |
| Réz                    | mg/kg | 12,33  |
| Szelén                 | mg/kg | 0,27   |
| A-vitamin              | NE/kg | 14850,00   |
| D-3 vitamin            | NE/kg | 3000,00  |
| E-vitamin              | mg/kg | 100,00   |
| <b>Aromakészítmény</b> | +     |  |
| <b>Active Mos</b>      | +     |  |
| <b>XTRACT</b>          | +     |  |

